

مراقبت بعد از عمل

گذاشتن کیسه یخ روی اسکروتوم تا چند ساعت بعد از عمل برای کاهش تورم توصیه میشود.

بعد از ۴۸ ساعت میتوانید پانسمان را برداشته و حمام کنید.

اجتناب از فعالیت ها و ورزش سنگین در طی دو روز بعد از عمل، پوشیدن شورت برای حمایت اسکروتوم توصیه می شود.

تغییر رنگ کم و التهاب سطحی یا بی رنگ شدن اسکروتوم بعد از عمل موقتی است.

درد و سوزش و خارش مختصر در ناحیه عمل جراحی طبیعی است.

تا ۳ روز پس از عمل میتوانید به فعالیت های عادی برگردید.

واریکوسل

اتساع غیر طبیعی شبکه ی وریدهای پیچ در پیچ کیسه ی بیضه می باشد. در اکثر موارد واریکوسل در بیضه چپ ایجاد می شود.


علائم واریکوسل

واریکوسل غالباً بدون علامت است ولی فرد ممکن است درد اسکروتوم، حساسیت و احساس سنگینی در ناحیه مغبنی و حتی عقیمی را تجربه کند.

اگر واریکوسل پیش رونده باشد و باعث اختلال در باروری فرد شود جراحی انجام می گیرد.

در غیر اینصورت درمان نیاز نیست یک بیضه بند برای تسکین احساس سنگینی کفایت میکند.

واریکوسل Varicocele



کلینیک، دی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی و مرکز محدود تدبیر



تهیه کننده: صغری پاهنگ

1. clinicalkey
2. mayoclinic
3. Brunner & Suddarth's Textbook of Medical-Surgical Nursing
4. familydoctor

زمان مراجعه بعدی

جهت کشیدن بخیه ها ۷-۱۰ روز پس از عمل به پزشک مراجعه کنید. در صورتی که محل جراحی گرم، متورم، قرمز و دردناک شود و مقدار قابل توجهی مایع از محل برش خارج گردد و یا تب داشتید هرچه سریعتر به پزشک خود مراجعه کنید.

طی یک تا دو هفته اول بعد از عمل باید از انجام کارهای سنگین خودداری کنید.

اگر فعالیتی موجب ناراحتی شما شد باید قطع شود.

تورم و کبودی و التهاب مختصر در طول محل برش جراحی طبیعی بوده و ممکن است بین ۸-۶ ماه باقی بماند و نیاز به اقدام خاصی نیست .

برای راحتی بیشتر بعد از عمل لباس زیر نخی بپوشید.